

KWIATOSTAN LIPY

Pozwolenie nr: 11463

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Kwiatostan lipy

Tiliae flos

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,0 g/saszetkę

30 saszetek po 2,0 g

Skład leku:

Kwiat lipy (*Tiliae flos*) - 2,0 g



Wskazania do stosowania:

W przeziębieniach jako lek przeciwgorączkowy i napotny.

Droga podania:

Doustna.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać 15 minut pod przykryciem. Pić 2 razy dziennie po 1 szklance świeżo przygotowanego naparu. Leczenie należy rozpocząć przy pierwszych objawach przeziębienia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwiat lipy. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania leku lub występuje duszność, wysoka gorączka lub ropna płwocina należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustępują po tygodniu stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:

Nieznane.

Ciąża i karmienie piersią:

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Nieznane.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub



KWIATOSTAN LIPY

pielęgniарce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowanie

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.29

