

ZIOŁA DO ZMNIEJSZENIA NADWAGI

Pozwolenie nr: IL-5778/LN

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Zioła do zmniejszania nadwagi

Species reducentes

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,0 g

Skład:

Kłącze perzu (*Graminis rhizoma*) - 0,70 g

Ziele skrzypu (*Equiseti herba*) - 0,66 g

Ziele mniszka (*Taraxaci herba*) - 0,40 g

Korzeń mniszka (*Taraxaci radix*) - 0,20 g

Kora kruszyny (*Frangulae cortex*) - 0,04 g



Wskazania do stosowania:

Pomocniczo jako łagodny lek żółciopędny i moczopędny.

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli. Jedną saszetkę zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Pić 1-2 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u dzieci do 12 lat. U młodzieży powyżej 12 lat stosować tylko w porozumieniu z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na zawartość kory kruszyny nie przyjmować dłużej niż kilka dni. Dłuższe stosowanie wymaga porady lekarza.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji



ZIOŁA DO ZMNIEJSZENIA NADWAGI

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. S. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 058 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Termin ważności:

Nr serii:

Data zatwierdzenia informacji: 09.11.2016

