

ZIOŁA PRZECIWREUMATYCZNE

Pozwolenie nr: IL-5996/LN

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Zioła przeciwreumatyczne
Species antirheumaticae
Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,3 g

Skład leku:

kora wierzby (*Salicis cortex*) - 575 mg,
liść pokrzywy (*Urticae folium*) - 460 mg,
ziele skrzypu (*Equiseti herba*) - 345 mg,
liść brzozy (*Betulae folium*) - 345 mg,
liść topoli (*Populi folium*) - 345 mg,
korzeń mniszka (*Taraxaci radix*) - 115 mg,
ziele mniszka (*Taraxaci herba*) - 115 mg.



Jedna saszetka zawiera 2,3 g ziół o zawartości nie mniejszej niż 1,0% flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę i zawartości nie mniejszej niż 0,5% glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.

Działanie:

Przeciwniezapalne, słabe działanie moczopędne.

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w schorzeniach reumatycznych.

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli: Dwie saszetki zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Pić 3 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w przeszłości obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych), pyłek brzozy, rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (*Asteraceae/Compositae*) lub na którykolwiek ze składników leku; astma, czynna choroba wrzodowa, trzeci trymestr ciąży, ciężkie choroby wątroby, nerek lub serca, niedrożność dróg żółciowych, zapalenie dróg żółciowych, kamienie żółciowe, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, cukrzyca. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Produkt nie jest przeznaczony do leczenia ostrych stanów zapalnych stawów. Jeśli gorączka przekroczy 39°C, utrzymuje się lub związana jest z silnym bólem głowy, bądź objawy nasilają się podczas stosowania, wystąpi gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcz lub krew w moczu, obrzęki stawów, zaczerwienie należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się równoczesnego stosowania z salicylanami i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

Kora wierzby, zawarta w produkcie, może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak pochodne kumaryny.



ZIOŁA PRZECIWPREUMATYCZNE

Ciąża i karmienie piersią:

Nie jest zalecane stosowane w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz podczas laktacji. Salicylany przechodzą przez łożysko i do mleka matki. Przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle w nadbrzuszu, niestrawność, zgaga), reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczny nieżyt nosa, wykwit). Częstość nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

IWLF Labofarm
mgr farm. Tadeusz Pawełek
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Nr serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.10.11

