

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego produktu leczniczego

Liść pokrzywy

Urticae folium

ziola do zaparzania w saszetkach, 2,0 g/saszetkę

30 saszetek po 2,0 g

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w leczeniu objawowym dolegliwości stawowych o niewielkim nasileniu oraz pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego, jako środek zwiększający ilość wydalanego moczu, w celu przepłukania dróg moczowych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na liść pokrzywy; schorzenia, w których wskazana jest zmniejszona podaż płynów (np. ciężka niewydolność serca lub choroba nerek).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich danych. Jeśli bólowi stawów towarzyszy obrzęk stawów, zaczerwienienie lub gorączka, bądź jeśli drobne dolegliwości ze strony układu moczowego nasilą się lub wystąpią: gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcz lub krew w moczu, a także w przypadku nasilenia się objawów lub braku poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:

Brak danych.

Ostrzeżenia specjalne:

Ciąża i karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody (200 ml) i zaparzać pod przykryciem 10 minut. Dorośli, osoby starsze i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 szklankę ciepłego, świeżo przygotowanego naparu pić 3-6 razy dziennie. Przyjmować maksymalnie 6 saszetek dziennie.

W leczeniu dolegliwości stawowych nie stosować dłużej niż 4 tygodnie, w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczowego nie stosować dłużej niż 2-4 tygodnie.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie:

Brak danych

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Działania niepożądane:

Z danych literaturowych wynika, że mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka) i reakcje skórne (np. swędzenie, wysypka, pokrzywka).

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, (aktualny adres, tel., faks, e-mail). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

Liść pokrzywy (*Urticae folium*) 2,0 g/saszetkę

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Nr serii:

Termin ważn.:

Pozwolenie nr: IL-6179/LN

Kod kreskowy EAN UCC 5909990022120

Data zatwierdzenia tekstu opakowania zewnętrznego:
05.04.2024

Informacja podana systemem Braille'a:
Liść pokrzywy