

ZIOŁA PRZECIWBIEGUNKOWE

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5831/LN

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Zioła przeciwbiegunkowe

Species antidiarrhoicae

Zioła do zaparzania w saszetkach.

30 saszetek po 2,5 g



Skład jednej saszetki:

Kłącze pięciornika (<i>Tormentillae rhizoma</i>)	0,750 g
Liść mięty pieprzowej (<i>Menthae piperitae folium</i>)	0,625 g
Nasienie psyllidki (<i>Psyllii semen</i>)	0,375 g
Liść jeżyny fałdowanej (<i>Rubi fruticosi folium</i>)	0,375 g
Liść szalwii (<i>Salviae folium</i>)	0,375 g

Wskazania do stosowania:

Pić napar w lekkich biegunkach.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na mentol, rośliny z rodziny *Lamiaceae* lub na którykolwiek składnik leku. Nie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym, zgagą, kamicą żółciową i innymi schorzeniami dróg żółciowych powinni być ostrożni w stosowaniu preparatów z liściem mięty. W przypadku, gdy biegunka przedłuża się powyżej 3 dni lub przy nawracających biegunkach i pojawianiu się krwi w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Ze względu na zawartość garbników o działaniu ściągającym na błony śluzowe, preparat może osłabiać wchłanianie innych leków. Z tego powodu lek powinien być przyjmowany 1 godzinę lub więcej przed lub po przyjęciu innych leków. Zawarty w preparacie liść szalwii może wpływać na działanie leków działających poprzez receptory GABA (np. barbiturany, benzodiazepiny). Dlatego nie zaleca się równoczesnego stosowania z takimi lekami.

Ostrzeżenia specjalne

Stosowanie podczas ciąży i karmienia:

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych:

Ze względu na obecność liścia szalwii lek u osób wrażliwych może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.



ZIOŁA PRZECIWBIEGUNKOWE

Dawkowanie i sposób podawania:

2 saszetki ziół zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem 15-20 minut.

Dorośli, osoby w wieku podeszłym: pić napar przeciętnie 2-4 razy dziennie, w zależności od nasilenia biegunki.

Młodzież i dzieci powyżej 6 lat: Stosować połowę dawki jednorazowej dla dorosłych.

Lek nie powinien być przyjmowany dłużej niż 3 dni.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych, dolegliwości żołądkowo-jelitowych (wzdęcia, nudności, wymioty), nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, fax 22 49 21 309, e-mail ndl@urpl.gov.pl). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

IL-5831/LN

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca

Labofarm sp. z o.o.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

Data opracowania informacji: 05.04.2024

